Creative Enzymes®

NAD(P)+ トランスヒドロゲナーゼ (Re/Si特異的)

Cat. No. EXWM-1575

Lot. No. (See product label)

はじめに

□明	心臓ミトコンドリア由来の酵素は、NAD+に関してRe特異的であり、NADP+に関してSi特異的です【参照：EC 1.6.1.1 NAD(P)+トランスヒドロゲナーゼ（Si特異的）】。
別名	ピリジンヌクレオチドトランスヒドロゲナーゼ; トランスヒドロゲナーゼ; NAD(P)+トランスヒドロゲナーゼ; ニコチンアミドアデニンジヌクレオチド（リン酸）トランスヒドロゲナーゼ; NAD+トランスヒドロゲナーゼ; NADHトランスヒドロゲナーゼ; ニコチンアミドヌクレオチドトランスヒドロゲナーゼ; NADPH-NAD+トランスヒドロゲナーゼ; ピリジンヌクレオチドトランスフェラーゼ; NADPH-NAD+オキシドレダクターゼ; NADH-NADP+-トランスヒドロゲナーゼ; NADPH:NAD+トランスヒドロゲナーゼ; H+-Thase; エネルギー連結トランスヒドロゲナーゼ; NAD(P)トランスヒドロゲナーゼ（AB特異的）; NAD(P)+トランスヒドロゲナーゼ（AB特異的）; NADPH:NAD+オキシドレダクターゼ（AB特異的）

製品情報

形態	液体または凍結乾燥粉末
EC番号	EC 1.6.1.2
CAS登□番号	9014-18-0, 9072-60-0
反□	NADPH + NAD+ = NADP+ + NADH
備考	このアイテムはカスタム生産が必要で、リードタイムは5□9週間です。ご要望に□じてカスタム生産が可能です。

保管・発送情報

保存方法	短期間は +4 ℃ で保管してください。長期間保管する場合は -20 ℃~-80 ℃ で保管してください。