Creative Enzymes®

NAD(P)+ トランスヒドロゲナーゼ

Cat. No. EXWM-1576

Lot. No. (See product label)

はじめに

□明	酵素はNADPH□動のNAD+の還元を触媒します。このエントリは、NADPHに関する立体特異性が不明な酵素を示します。[cf. EC 1.6.1.1、NAD(P)+トランス水素化酵素（Si特異的）およびEC 1.6.1.2 NAD(P)+トランス水素化酵素（Re/Si特異的）]。
別名	ピリジンヌクレオチドトランスヒドロゲナーゼ; トランスヒドロゲナーゼ（あいまい）; ニコチンアミドアデニンジヌクレオチド（リン酸）トランスヒドロゲナーゼ（あいまい）; NAD+トランスヒドロゲナーゼ（あいまい）; NADHトランスヒドロゲナーゼ（誤解を招く）; ニコチンアミドヌクレオチドトランスヒドロゲナーゼ（あいまい）; NADPH-NAD+トランスヒドロゲナーゼ（あいまい）; ピリジンヌクレオチドトランスフェラーゼ（あいまい）; NADPH-NAD+オキシドレダクターゼ（あいまい）; NADH-NADP+-トランスヒドロゲナーゼ（あいまい）; NADPH:NAD+トランスヒドロゲナーゼ; H+-Thase（あいまい）; 非エネルギー結合トランスヒドロゲナーゼ（あいまい）

製品情報

形態	液体または凍結乾燥粉末
EC番号	EC 1.6.1.3
反□	NADPH + NAD+ = NADP+ + NADH
備考	このアイテムはカスタム生産が必要で、リードタイムは5□9週間です。ご要望に□じてカスタム生産が可能です。

保管・発送情報

保存方法	短期間は +4 ℃ で保管してください。長期間保管する場合は -20 ℃~-80 ℃ で保管してください。