Creative Enzymes®

ホモシステイン S-メチルトランスフェラーゼ

Cat. No. EXWM-1697

Lot. No. (See product label)

はじめに

□明	酵素はS-メチル-L-メチオニンよりもS-アデノシル-L-メチオニンをメチル供与体としてあまり活発に使用しません。
別名	S-アデノシルメチオニン ホモシステイン トランスメチル化酵素; S-メチルメチオニン ホモシステイン トランスメチル化酵素; アデノシルメチオニン トランスメチル化酵素; メチルメチオニン:ホモシステイン メチルトランスフェラーゼ; アデノシルメチオニン:ホモシステイン メチルトランスフェラーゼ; ホモシステイン メチラーゼ; ホモシステイン メチルトランスフェラーゼ; ホモシステイン トランスメチル化酵素; L-ホモシステイン S-メチルトランスフェラーゼ; S-アデノシル-L-メチオニン:L-ホモシステイン メチルトランスフェラーゼ; S-アデノシルメチオニン-ホモシステイン トランスメチル化酵素; S-アデノシルメチオニン:ホモシステイン メチルトランスフェラーゼ

製品情報

形態	液体または凍結乾燥粉末
EC番号	EC 2.1.1.10
CAS登□番号	9012-40-2
反□	S-メチル-L-メチオニン + L-ホモシステイン = 2 L-メチオニン
備考	このアイテムはカスタム生産が必要で、リードタイムは5□9週間です。ご要望に□じてカスタム生産が可能です。

保管・発送情報

保存方法	短期間は +4 ℃ で保管してください。長期間保管する場合は -20 ℃~-80 ℃ で保管してください。