Creative Enzymes®

イソフラボン-7-O-β-グルコシド 6''-O-マロニルトランスフェラーゼ

Cat. No. EXWM-2054

Lot. No. (See product label)

はじめに

□明	フォルモノネチンのグルコース残基の6位は受容体としても機能することができる。他のいくつかのイソフラボン、フラボン、フラボノールの7-O-グルコシドも受容体として機能するが、より□い。
別名	フラボン/フラボノール 7-O-β-D-グルコシド マロニルトランスフェラーゼ; フラボン (フラボノール) 7-O-グリコシド マロニルトランスフェラーゼ; マロニル-CoA:フラボン/フラボノール 7-O-グルコシド マロニルトランスフェラーゼ; MAT-7; マロニル-コエンザイム A:イソフラボン 7-O-グルコシド-6''-マロニルトランスフェラーゼ; マロニル-コエンザイム A:フラボン/フラボノール-7-O-グリコシド マロニルトランスフェラーゼ

製品情報

形態	液体または凍結乾燥粉末
EC番号	EC 2.3.1.115
CAS登□番号	93585-97-8, 78413-09-9
反□	マロニル-CoA + バイオカニン A 7-O-β-D-グルコシド = CoA + バイオカニン A 7-O-(6-O-マロニル-β-D-グルコシド)
備考	このアイテムはカスタム生産が必要で、リードタイムは5□9週間です。ご要望に□じてカスタム生産が可能です。

保管・発送情報

保存方法	短期間は +4 ℃ で保管してください。長期間保管する場合は -20 ℃~-80 ℃ で保管してください。