Creative Enzymes®

# 13-ヒドロキシドコサン酸 13-β-グルコシルトランスフェラーゼ

*Cat. No. EXWM-2382*

*Lot. No.* (See product label)

## *はじめに*

| | |
|---|---|
| *□明* | 13-β-D-グルコシルオキシドコサン酸は、受容体としても機能し、カンジダ・ボゴリエンシスによって細胞外グリコリピッドであるヒドロキシドコサン酸ソフォロシドジアセテートが形成されることにつながります。 |
| *別名* | 13-グルコシルオキシドコサン酸 2'-β-グルコシルトランスフェラーゼ; UDP-グルコース:13-ヒドロキシドコサン酸グルコシルトランスフェラーゼ; ウリジン二リン酸グルコース-ヒドロキシドコサン酸グルコシルトランスフェラーゼ; UDP-グルコース-13-ヒドロキシドコサン酸グルコシルトランスフェラーゼ |

## *製品情報*

| | |
|---|---|
| *形態* | 液体または凍結乾燥粉末 |
| ***EC番号*** | EC 2.4.1.158 |
| ***CAS登□番号*** | 70457-13-5 |
| *反□* | UDP-グルコース + 13-ヒドロキシドコサン酸 = UDP + 13-β-D-グルコシルオキシドコサン酸 |
| *備考* | このアイテムはカスタム生産が必要で、リードタイムは5□9週間です。ご要望に□じてカスタム生産が可能です。 |

## *保管・発送情報*

| | |
|---|---|
| *保存方法* | 短期間は +4 ℃ で保管してください。長期間保管する場合は -20 ℃~-80 ℃ で保管してください。 |