Creative Enzymes®

トリアシルグリセロールリパーゼ

Cat. No. EXWM-3455

Lot. No. (See product label)

はじめに

□明	膵臓酵素はエステル-水界面でのみ作用し、外側のエステル結合が優先的に加水分解されます。
別名	リパーゼ (あいまい); ブチリナーゼ; トリブチリンナーゼ; ツイーン加水分解酵素; ステアプシン; トリアセチナーゼ; トリブチリンエステラーゼ; ツイーンエース; アマノ N-AP; タケド 1969-4-9; メイト MY 30; ツイーンエステラーゼ; GA 56; カパラーゼ L; トリグリセリド加水分解酵素; トリオレイン加水分解酵素; ツイーン加水分解エステラーゼ; アマノ CE; カコルダーゼ; トリグリセリダーゼ; トリアシルグリセロールエステル加水分解酵素; アマノ P; アマノ AP; PPL; グリセロールエステル加水分解酵素; GEH; メイト産業 OF リパーゼ; 肝リパーゼ; リパジン; ポストヘパリン血漿プロタミン耐性リパーゼ; 塩耐性ポストヘパリンリパーゼ; ヘパリン放出可能肝リパーゼ; アマノ CES; アマノ B; トリブチラーゼ; トリグリセリドリパーゼ; 肝リパーゼ; 肝モノアシルグリセロールアシルトランスフェラーゼ

製品情報

形態	液体または凍結乾燥粉末
EC番号	EC 3.1.1.3
CAS登□番号	9001-62-1
反□	トリアシルグリセロール + H2O = ジアシルグリセロール + カルボキシレート
備考	このアイテムはカスタム生産が必要で、リードタイムは5□9週間です。ご要望に□じてカスタム生産が可能です。

保管・発送情報

保存方法	短期間は +4 ℃ で保管してください。長期間保管する場合は -20 ℃~-80 ℃ で保管してください。