

トリアシルグリセロールリパーゼ

Cat. No. EXWM-3455

Lot. No. (See product label)

はじめに

説明	膵臓酵素はエステル-水界面でのみ作用し、外側のエステル結合が優先的に加水分解されます。
別名	リパーゼ (あいまい); ブチリナーゼ; トリブチリンナーゼ; ツイーン加水分解酵素; ステアプシン; トリアセチナーゼ; トリブチリンエステラーゼ; ツイーンエース; アマノ N-AP ; タケド 1969-4-9 ; メイト MY 30 ; ツイーンエステラーゼ; GA 56 ; カパラーゼ L ; トリグリセリド加水分解酵素; トリオレイン加水分解酵素; ツイーン加水分解エステラーゼ; アマノ CE ; カコルダーゼ; トリグリセリダーゼ; トリアシルグリセロールエステル加水分解酵素; アマノ P ; アマノ AP ; PPL ; グリセロールエステル加水分解酵素; GEH ; メイト産業 OF リパーゼ; 肝リパーゼ; リパジン; ポストヘパリン血漿プロタミン耐性リパーゼ; 塩耐性ポストヘパリンリパーゼ; ヘパリン放出可能肝リパーゼ; アマノ CES ; アマノ B ; トリブチラーゼ; トリグリセリドリパーゼ; 肝リパーゼ; 肝モノアシルグリセロールアシルトランスフェラーゼ

製品情報

形態	液体または凍結乾燥粉末
EC番号	EC 3.1.1.3
CAS登録番号	9001-62-1
反応	トリアシルグリセロール + H ₂ O = ジアシルグリセロール + カルボキシレート
備考	このアイテムはカスタム生産が必要で、リードタイムは5~9週間です。ご要望に応じてカスタム生産が可能です。

保管・発送情報

保存方法	短期間は +4 °C で保管してください。長期間保管する場合は -20 °C~-80 °C で保管してください。
------	--