

マンノシル-グリコプロテイン エンド- β -N-アセチルグルコサミニダーゼ

Cat. No. EXWM-3959

Lot. No. (See product label)

はじめに

説明

関連する酵素のグループ。

別名

N,N'-ジアセチルキトピオシル β -N-アセチルグルコサミニダーゼ; エンド- β -N-アセチルグルコサミニダーゼ; マンノシル-グリコプロテイン エンド- β -N-アセチルグルコサミニダーゼ; ジ-N-アセチルキトピオシル β -N-アセチルグルコサミニダーゼ; エンド- β -アセチルグルコサミニダーゼ; エンド- β -(1 $\rightarrow$ 4)-N-アセチルグルコサミニダーゼ; マンノシル-グリコプロテイン 1,4-N-アセトアミドデオキシ- β -D-グリコヒドロラーゼ; エンドグリコシダーゼ S; エンド-N-アセチル- β -D-グルコサミニダーゼ; エンド-N-アセチル- β -グルコサミニダーゼ; エンド- β -N-アセチルグルコサミニダーゼ D; エンド- β -N-アセチルグルコサミニダーゼ F; エンド- β -N-アセチルグルコサミニダーゼ H; エンド- β -N-アセチルグルコサミニダーゼ L; グリコペプチド-D-マンノシル-4-N-(N-アセチル-D-グルコサミニル)2-アスパラギン 1,4-N-アセチル- β -グルコサミノヒドロラーゼ; エンドグリコシダーゼ H

製品情報

形態

液体または凍結乾燥粉末

EC番号

EC 3.2.1.96

CAS登録番号

37278-88-9

反応

高マンノースグリコペプチドおよび- [Man(GlcNAc)2]Asn-構造を含むグリコプロテインにおけるN,N'-ジアセチルキトピオシルユニットのエンドヒドロリシス。1つのN-アセチル-D-グルコサミン残基がタンパク質に付着したままであり、オリゴ糖の残りは無傷で放出される。

備考

このアイテムはカスタム生産が必要で、リードタイムは5~9週間です。ご要望に応じてカスタム生産が可能です。

保管・発送情報

保存方法

短期間は +4 °C で保管してください。長期間保管する場合は -20 °C~-80 °C で保管してください。