Creative Enzymes®

凝固因子XIIa

Cat. No. EXWM-4132

Lot. No. (See product label)

はじめに

□明	プラスミノーゲンとプラズマプロカリクレインも活性化します。プラズマカリクレインまたは因子XIIaによって、前酵素である因子XIIから形成されます。ペプチダーゼファミリーS1（トリプシンファミリー）に属します。
別名	ハゲマン因子（活性化）；血液凝固因子 XIIf；活性化 β 血液凝固因子 XII；プレアルブミン活性化因子；ハゲマン因子 β フラグメント；ハゲマン因子フラグメント HFf；血液凝固因子 XIIaβ；プレカリクレイン活性化因子；カリクレイン原活性化因子

製品情報

形態	液体または凍結乾燥粉末
EC番号	EC 3.4.21.38
CAS登□番号	75216-42-1
反□	因子VIIのアルギニン┼イソロイシン結合の選□的切断により因子VIIaが形成され、因子XIの切断により因子XIaが形成される
備考	このアイテムはカスタム生産が必要で、リードタイムは5□9週間です。ご要望に□じてカスタム生産が可能です。

保管・発送情報

保存方法	短期保存の場合は+4 ℃で保管してください。長期保存の場合は-20 ℃~-80 ℃で保管してください。