Creative Enzymes®

kexin

Cat. No. EXWM-4152

Lot. No. (See product label)

はじめに

□明	Ca2+活性化ペプチダーゼで、ペプチダーゼファミリーS8に属し、活性部位のHisの近くにCysを含み、p-マーキュリベンゾエートによって阻害されます。類似の酵素は哺乳類にも存在します。
別名	酵母 KEX2 プロテアーゼ; プロテイナーゼ yscF; プロホルモン処理内因性プロテアーゼ; ペア基本内因性ペプチダーゼ; 酵母システインプロテイナーゼ F (誤解を招く); ペア基本内因性ペプチダーゼ; アンドレノルフィン-Gly生成酵素; 内因性プロテイナーゼ Kex2p; 遺伝子 KEX2 二塩基プロテイナーゼ; Kex 2p プロテイナーゼ; Kex2 内因性ペプチダーゼ; Kex2 内因性プロテアーゼ; Kex2 内因性プロテイナーゼ; Kex2 プロテアーゼ; プロテイナーゼ Kex2p; Kex2□前□体タンパク質処理内因性プロテアーゼ; プロホルモン処理 KEX2 プロテイナーゼ; プロホルモン処理プロテイナーゼ; プロプロテインコンバターゼ; プロテアーゼ KEX2; Kex2 プロテイナーゼ; Kex2□内因性プロテイナーゼ

製品情報

形態	液体または凍結乾燥粉末
EC番号	EC 3.4.21.61
CAS登□番号	99676-46-7
反□	-Lys-Arg┼および-Arg-Arg┼結合の切断は、酵母α因子フェロモンおよびキラートキシン前□体を処理するためのものです。
備考	このアイテムはカスタム生産が必要で、リードタイムは5□9週間です。お客□の仕□に□じてカスタム生産が可能です。

保管・発送情報

保存方法	短期間は +4 ℃ で保管してください。長期間保管する場合は -20 ℃~-80 ℃ で保管してください。