Creative Enzymes®

# リムルス凝固因子C

*Cat. No. EXWM-4176*

*Lot. No.* (See product label)

## *はじめに*

| | |
|---|---|
| *□明* | カブトガニのヘモサイト顆粒から。ファクターCは、グラム陰性細菌のリポポリサッカライドおよびキモトリプシンによって活性化されます。抗トロンビンIIIによって抑制されます。ペプチダーゼファミリーS1（トリプシンファミリー）に属します。 |
| *別名* | ファクターC; リムルスファクターC |

## *製品情報*

| | |
|---|---|
| *形態* | 液体または凍結乾燥粉末 |
| ***EC番号*** | EC 3.4.21.84 |
| ***CAS登□番号*** | 115743-27-6 |
| *反□* | -Arg103┼Ser- および -Ile124┼Ile- 結合の選□的切断により、リムルス凝固因子Bが形成される。合成基質における -Pro-Arg┼ 結合の切断。 |
| *備考* | このアイテムはカスタム生産が必要で、リードタイムは5□9週間です。ご要望に□じてカスタム生産が可能です。 |

## *保管・発送情報*

| | |
|---|---|
| *保存方法* | 短期間は +4 ℃ で保管してください。長期間保管する場合は -20 ℃~-80 ℃ で保管してください。 |