Creative Enzymes®

UDP-3-O-アシル-N-アセチルグルコサミン脱アセチル化酵素

Cat. No. EXWM-4387

Lot. No. (See product label)

はじめに

□明	亜鉛タンパク質。酵素はリピッドAの生合成における重要なステップを触媒します。
別名	LpxCタンパク質; LpxC酵素; LpxC脱アセチル化酵素; 脱アセチル化酵素LpxC; UDP-3-O-アシル-GlcNAc脱アセチル化酵素; UDP-3-O-((R)-3-ヒドロキシミリストイル)-N-アセチルグルコサミン脱アセチル化酵素; UDP-(3-O-アシル)-N-アセチルグルコサミン脱アセチル化酵素; UDP-3-O-(R-3-ヒドロキシミリストイル)-N-アセチルグルコサミン脱アセチル化酵素; UDP-(3-O-(R-3-ヒドロキシミリストイル))-N-アセチルグルコサミン脱アセチル化酵素; UDP-3-O-[(3R)-3-ヒドロキシミリストイル]-N-アセチルグルコサミンアミドヒドロラ―ゼ

製品情報

形態	液体または凍結乾燥粉末
EC番号	EC 3.5.1.108
反□	UDP-3-O-[(3R)-3-ヒドロキシミリストイル]-N-アセチル-α-D-グルコサミン + H2O = UDP-3-O-[(3R)-3-ヒドロキシミリストイル]-α-D-グルコサミン + アセテ―ト
備考	このアイテムはカスタム生産が必要で、リードタイムは5□9週間です。ご要望に□じてカスタム生産が可能です。

保管・発送情報

保存方法	短期間は +4 ℃ で保管してください。長期間保管する場合は -20 ℃~-80 ℃ で保管してください。