

## クロストリジウム・パーフリゲンズ由来のβ-アセチルグルコサミニダーゼ 73A、組換え型

Cat. No. NATE-1289

Lot. No. (See product label)

### はじめに

**説明** この酵素は、複雑な炭水化物から非還元末端のβ1-2、β1-3、β1-4およびβ1-6結合のN-アセチルグルコサミンを放出します。低濃度 (<50 mU/ml) のオリゴ糖とインキュベートすると、酵素はGlcNAcβ1-2Man、GlcNAcβ1-4ManおよびGlcNAcβ1-6Manの結合を区別できます。このような条件下では、酵素は基本的にβ1-2結合のGlcNAcのみを切断しますが、2つの条件があります。第一に、β1-2 GlcNAcは、置換されたマンノースがC-6で置換されている場合には加水分解されません。したがって、この酵素は三枝状オリゴ糖の分析に有用です。第二に、保存されたペントサッカライドコアのβ結合マンノースが「二分する」GlcNAcで置換されている場合、α1-3アームのマンノースに結合したβ1-2結合のGlcNAcのみが切断されます。酵素の濃度が高くなると、β1-4およびβ1-6結合のGlcNAcも加水分解される可能性があります。

**別名** ベータ-N-アセチル-D-ヘキソサミニダーゼ; N-アセチルヘキソサミノヒドロラーゼ; β-N-アセチルヘキソサミニダーゼ; N-アセチル-β-D-グルコサミニダーゼ, β-N-アセチルグルコサミニダーゼ

### 製品情報

種	クロストリジウム・パーフリゲンズ
由来	大腸菌
形態	35 mM NaHepesバッファー、pH 7.5、750 mM NaCl、200 mM イミダゾール、3.5 mM CaCl <sub>2</sub> 、0.02% ナトリウムアジ化物および25% (v/v) グリセロール
分子量	24.6 kDa
純度	>90% は SDS-PAGE による
濃度	0.25 mg/mL
最適pH	8
最適温度	37 °C
特異性	ペプチドグリカン

### 保管・発送情報

**保存方法** この酵素は常温で出荷されますが、-20 °Cで保管する必要があります。