

## クレストリジウム・セルロリティウム由来のセルラーゼ 8C、組換え型

Cat. No. NATE-1348

Lot. No. (See product label)

### はじめに

**説明** セルラーゼは、主に真菌、細菌、原生生物によって生成されるいくつかの酵素の一つで、セルロースおよびいくつかの関連多糖類の分解であるセルロリシスを触媒します。具体的には、セルロース、ヘミセルロース、リケニン、穀物のペータ-D-グルカンにおける1,4-ペータ-D-グリコシド結合の加水分解です。セルラーゼは、セルロース分子をペータ-グルコースのような単糖（「単純糖」）や、より短い多糖類およびオリゴ糖に分解します。この名前は、セルロース材料を分解するために直列または相乗的に作用する、さまざまな酵素の自然に存在する混合物や複合体にも使用されます。

**別名** セルラーゼ、熱安定性; 1,4-(1,3:1,4)-β-D-グルカン 4-グルカノヒドロラーゼ; EC 3.2.1.4; セルラーゼ; エンド-1,4-β-D-グルカナーゼ; β-1,4-グルカナーゼ; β-1,4-エンドグルカンヒドロラーゼ; セルラーゼ A; セルロシン AP; エンドグルカナーゼ D; アルカリセルラーゼ; セルラーゼ A 3; セルデキストリナーゼ; 9.5 セルラーゼ; アビセララーゼ; パンセララーゼ SS

### 製品情報

|         |                                                                                                                   |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 種       | クレストリジウム・セルロリティウム                                                                                                 |
| 由来      | E. coli                                                                                                           |
| 形態      | 35 mM NaHepes バッファー、pH 7.5、750 mM NaCl、200 mM イミダゾール、3.5 mM CaCl <sub>2</sub> 、0.02% ナトリウムアジ化物および25% (v/v) グリセロール |
| EC番号    | EC 3.2.1.4                                                                                                        |
| CAS登録番号 | 9012-54-8                                                                                                         |
| 分子量     | 42.9 kDa                                                                                                          |
| 純度      | >90% は SDS-PAGE による                                                                                               |
| 濃度      | 1 mg/mL                                                                                                           |
| 最適pH    | 6                                                                                                                 |
| 最適温度    | 48 °C                                                                                                             |
| 特異性     | 1,4-β-グルカン、特に可溶性セルロース                                                                                             |

### 保管・発送情報

**保存方法** この酵素は常温で発送されますが、-20 °Cで保管する必要があります。