

Clostridium cellulolyticum由来のセルラーゼ9M、組換え型

Cat. No. NATE-1350

Lot. No. (See product label)

はじめに

□明 セルラーゼは、主に真菌、細菌、および原生動物によって生成されるいくつかの酵素の一つで、セルロースおよびいくつかの関連多糖類の分解であるセルロリシスを触媒します。具体的には、セルロース、ヘミセルロース、リケニン、および穀物のペーター-D-グルカンにおける1,4-ペーター-D-グリコシド結合の加水分解です。セルラーゼは、セルロース分子をペーター-グルコースのような単糖（「単純糖」）や、より短い多糖類およびオリゴ糖に分解します。この名前は、セルロース材料を分解するために直列または相乗的に作用する、さまざまな酵素の自然に存在する混合物または複合体にも使用されます。

別名 セルラーゼ、熱安定性; 1,4-(1,3:1,4)-β-D-グルカン 4-グルカノヒドロラーゼ; EC 3.2.1.4; セルラーゼ; エンド-1,4-β-D-グルカナーゼ; β-1,4-グルカナーゼ; β-1,4-エンドグルカンヒドロラーゼ; セルラーゼ A; セルロシン AP; エンドグルカナーゼ D; アルカリセルラーゼ; セルラーゼ A 3; セルデキストリナーゼ; 9.5 セルラーゼ; アビセラナーゼ; パンセラナーゼ SS

製品情報

種	クロストリジウム・セルロリティウム
由来	E. coli
形態	35 mM NaHepesバッファー、pH 7.5、750 mM NaCl、200 mM イミダゾール、3.5 mM CaCl ₂ 、0.02% ナトリウムアジ化物および25% (v/v) グリセロール
EC番号	EC 3.2.1.4
CAS登録番号	9012-54-8
分子量	50.7 kDa
純度	>90% は SDS-PAGE による
濃度	1 mg/mL
最適pH	6.5
最適温度	37 °C
特異性	リン酸膨潤セルロース（PASC）などのセルロース系炭水化物

保管・発送情報

保存方法 この酵素は常温で発送されますが、-20 °Cで保存する必要があります。