

クレストリジウム・サーモセラム由来のセルラーゼ **5C** およびアセチルキシランエステラーゼ **2A**、組換え

Cat. No. NATE-1374

Lot. No. (See product label)

はじめに

説明 セルラーゼは、主に真菌、細菌、原生動物によって生成されるいくつかの酵素の一つで、セルロースおよびいくつかの関連多糖類の分解であるセルロリシスを触媒します。具体的には、セルロース、ヘミセルロース、リグニン、穀物のペータ-D-グルカンにおける1,4-ペータ-D-グリコシド結合の加水分解です。セルラーゼは、セルロース分子をペータ-グルコースのような単糖（「単純糖」）や、より短い多糖類およびオリゴ糖に分解します。この名前は、セルロース材料を分解するために直列または相乗的に作用する、さまざまな酵素の自然に存在する混合物または複合体にも使用されます。

別名 セルラーゼ、熱安定性; 1,4-(1,3:1,4)-β-D-グルカン 4-グルカノヒドロラーゼ; EC 3.2.1.4; セルラーゼ; エンド-1,4-β-D-グルカナーゼ; β-1,4-グルカナーゼ; β-1,4-エンドグルカンヒドロラーゼ; セルラーゼ A; セルロシン AP; エンドグルカナーゼ D; アルカリセルラーゼ; セルラーゼ A 3; セルデキストリナーゼ; 9.5 セルラーゼ; アビセラーゼ; パンセラーゼ SS

製品情報

種	クレストリジウム・テルモセラム
由来	大腸菌
形態	35 mM NaHepesバッファー、pH 7.5、750 mM NaCl、200 mM イミダゾール、3.5 mM CaCl ₂ 、0.02% ナトリウムアジ化物および25% (v/v) グリセロール
EC番号	EC 3.2.1.4 & EC 3.2.1.72
CAS登録番号	9012-54-8
分子量	88.9 kDa
純度	>90% は SDS-PAGE による
活性	セルラーゼ 5C: 130 U/mg および アセチルキシランエステラーゼ 2A: 74 U/mg
濃度	1 mg/mL
最適pH	6.5-8
最適温度	60 °C
特異性	セルロースおよび1,3-1,4-β-グルカン（GH5）の可溶性形態は、アセチル化キシラン、グルコマンナンおよびガラクトグルコマンナン（CE2）からアセテートを放出します。

保管・発送情報

保存方法 この酵素は常温で出荷されますが、-20 °Cで保存する必要があります。