

ポリ I: C

Cat. No. LIGC-002

Lot. No. (See product label)

はじめに

説明 合成二本鎖RNA (dsRNA) ; トール受容体3 (TLR3) アゴニスト。安定した成熟樹状細胞の生成を助ける。NIT-1 β細胞へのトランスフェクションはβ細胞のアポトーシスを誘導する。免疫刺激剤。

別名 ポリイノシン酸-ポリシチジル酸ナトリウム塩; ポリイノシン酸、ホモポリマー、ポリシチジル酸、ホモポリマーとの複合体 (1:1) ; ポリ(C).ポリ(I); ポリ(C:I); ポリ(I)-ポリ(C); ポリ(I).ポリ(C); ポリ(I).ポリ(C) 複合体; ポリ (シチジル酸) -ポリ (イノシン酸) ; ポリ (rl) -ポリ (rC) ; ポリ (rl) .ポリ (rC) ; ポリ (rl) : ポリ (rC) ; ポリ (rl:rC) ; ポリシチジル酸-ポリイノシン酸; ポリイノシネート-ポリシチジレート 複合体; ポリイノシネート; ポリシチジレート; ポリイノシン-ポリシチジル酸; ポリイノシン酸; ポリシチジル酸

製品情報

外形 白からオフホワイトの粉末

CAS登録番号 24939-03-5

分子式 (C10H13N4O8P)x.(C9H14N3O8P)x

溶解度 水に3 mg/mlで溶解します

保管・発送情報

保存方法 -20°Cで保管してください。

安定性 固体: 製品ラベルに記載された通りの保管が行われ、バイアルがしっかりと密閉されている限り、製品は受領日から最大6ヶ月間保存できます。 溶液: ストック溶液は、一度調製されたら、-20°C以下の密閉されたバイアルに分注して保存し、1ヶ月以内に使用することをお勧めします。可能な限り、溶液はその日のうちに調製して使用するべきです。