Creative Enzymes®

ポリ I: C

Cat. No. LIGC-002

Lot. No. (See product label)

はじめに

□明	合成二本鎖RNA（dsRNA）；トール□受容体3（TLR3）アゴニスト。安定した成熟樹状細胞の生成を助ける。NIT-1 β細胞へのトランスフェクションはβ細胞のアポトーシスを誘導する。免疫刺激剤。
別名	ポリイノシン酸-ポリシチジル酸ナトリウム塩；ポリイノシン酸、ホモポリマー、ポリシチジル酸、ホモポリマーとの複合体（1:1）；ポリ(C).ポリ(I)；ポリ(C:I)；ポリ(I)-ポリ(C)；ポリ(I).ポリ(C)；ポリ(I).ポリ(C) 複合体；ポリ（シチジル酸）-ポリ（イノシン酸）；ポリ（rI）-ポリ（rC）；ポリ（rI）.ポリ（rC）；ポリ（rI）：ポリ（rC）；ポリ（rI:rC）；ポリシチジル酸-ポリイノシン酸；ポリイノシネート-ポリシチジレート 複合体；ポリイノシネート：ポリシチジレート；ポリイノシン-ポリシチジル酸；ポリイノシン酸：ポリシチジル酸

製品情報

外□	白からオフホワイトの粉末
CAS登□番号	24939-03-5
分子式	(C10H13N4O8P)x.(C9H14N3O8P)x
溶解度	水に3 mg/mlで溶解します

保管・発送情報

保存方法	-20°Cで保管してください。
安定性	固体：製品ラベルに記載された通りの保管が行われ、バイアルがしっかりと密閉されている限り、製品は受領日から最大6ヶ月間保存できます。 溶液：ストック溶液は、一度調製されたら、-20°C以下の密閉されたバイアルに分注して保存し、1ヶ月以内に使用することをお勧めします。可能な限り、溶液はその日のうちに調製して使用するべきです。